


ULOGA MEDICINSKE SESTRE U KETOACIDOZI

Nina Lunić - Radojković

UNIVERZITETSKA BOLNICA KLINIČKI CENTAR BANJALUKA

Dijabetička ketoacidoza je akutna komplikacija šećerne bolesti koja može nastati naglo, u roku od nekoliko sati ili u toku jednog dana. Medicinske sestre su upoznate sa komplikacijama dijabetesa, obrađujući najviše pažnje na mogućnost letalnog ishoda, a u cilju pravilnog edukovanja pacijenata.



HITNA STANJA U ENDOKRINOLOGIJI	KLINIČKA SLIKA	ULOGA MEDICINSKE SESTRE
HIPOGLIKEMIJA	Slabost, znojenje, drhtanje, tahikardija, nervoza, osjećaj straha, mentalna konfuzija, preznajavanje (hladan znoj), osjećaj gladi, pospanost do kome	Smiriti pacijenta, kod blagih oblika hipoglikemije dati 2dd Coca-Cole ili 2-3 kocke šećera, kod težih oblika hipoglikemije otvoriti venski put, kateterizirati pacijenta, dati 30-50ml 50% glucosae IV ili 1mg glukagona, vrijednosti šećera u krvi kontrolisati na 15 minuta
DIJABETIČKA KETOACIDOZA I KOMA	Hiperventilacija (KUSSMAULOVO disanje), dehidracija, tahikardija, somnolencija, zadržak na aceton, povraćanje, mučnina, abdominalna bol	Otvoriti dva venska puta, kateterizirati pacijenta, vršiti dvadesetčetveročasovni monitoring pacijenta (mjeriti krvni pritisak, puls i temperaturu, unos tečnosti i diurezu te kontrolisati glikemije na 2 sata), aplicirati terapiju po nalogu ljekara
HIPERTIREOZA (tirotoksična kriza ili oluja)	Povišena temperatura, izmjenjeno mentalno stanje, drhtanje, nemir, mučnina, gađenje, povraćanje, abdominalna bol, koža je topla i vlažna, disanje otežano, prisutna aritmija sa tahikardijom 150/min	Umiriti pacijenta, otvoriti venski put, kateterizirati, obavezan monitoring pacijenta, aplicirati terapiju po nalogu ljekara
HIPOTIREOZA (miksedomna koma)	Hipotermija (temperatura ispod 34 stepena), hipotenzija, respiratorna insuficijencija, suva koža, bradikardija, miksedom	Procijeniti respiratorne funkcije, kod otežanog disanja intubirati pacijenta, otvoriti venski put, kateterizirati pacijenta, obavezan dvadesetčetveročasovni monitoring (pratiti disanje, mjeriti temperaturu, puls i krvni pritisak te diurezu na dva sata)
ADISONSKA KRIZA	Izražena opšta slabost, malaksalost, anoreksija, hipotenzija, povraćanje, žeđ, abdominalna bol, hiperpigmentacija na određenim dijelovima tijela, poremećaj svijesti do kome	Otvoriti venski put, kateterizirati pacijenta, monitoring pacijenta, aplicirati terapiju po nalogu ljekara