

Rak grlića materice je drugi najčešći karcinom kod žena mlađih od 45g i kao takav predstavlja vodeći uzrok smrti žena u svijetu (nakon raka dojke i pluća). Otkrivanje bolesti na vrijeme daje dobru prognozu u liječenju karcinoma grlića.

**Cilj rada:**

Ispitati učestalost prekanceroznih lezija grlića kao i karcinoma grlića.

Ispitati riziko faktore u nastanku karcinoma grlića materice.

**Metode rada:**

Studija je retrospektivna analiza kojom smo obradili preventivne aktivnosti Ca grlića sa nalizom PAPA nalaza.

Kod ispitanica smo obradili podatke o samoinicijativnom ginekološkom pregledu i pregledu na prijedlog porodičnog doktora u sklopu prevencije karcinoma grlića.

Na osnovu analize podataka u našem radu može se zaključiti da je cilj prevencije da se u ranoj fazi otkriju promjene na cerviksu i karcinom u početnoj fazi .

Analiza je pokazala da najveći broj suspektnih nalaza susrećemo kod žena starosti 30/39g.

Simptome kao razlog javljanja imalo je 587 od ukupno 2170 žena.

Razvrstavanje nalaza sistemom PAPA klasifikacije dobijamo rezultat da je u prvoj grupi koja se posmatra kao uredna 914 nalaza. U drugoj koja pokazuje znake blage upale 1176 nalaza. U trećoj grupi koja pokazuje znake displazije nalazimo 43 nalaza. Četvrta grupa ima 21 i peta 16 nalaza.

Na osnovu analize podataka može se zaključiti da je cilj prevencije da se u ranoj fazi otkriju promjene na cerviksu i karcinom u početnoj fazi. Zato treba posvetiti posebnu pažnju edukaciji žena o ovoj važnoj mjeri zaštite zdravlja.