




## Polno prenosive bolesti Svetlana Pejčinović Ginekološko akušerska klinika UKC Republike Srpske



**Uzročnici polno prenosivih bolesti su virusi, bakterije, gljivice i ostali mikroorganizmi.** Neki uzročnici, osim polnim odnosom, mogu se prenijeti putem krvi, najčešće zajedničkom upotrebori igala i šprica kod uzimanja droge ili sa zaražene trudnice na dijete tokom trudnoće i poroda. Polno prenosive bolesti značajne su zbog svoje raširenosti, kao i zbog mogućih posljedica (neplodnost, vanmaternična trudnoća, negativan uticaj na ishod trudnoće, bolest i smrt dojenčadi, zločudne tvorevine grlića maternice...).



Postoji više od 30 različitih **bakterija** Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, **virusa** (HPV, HSV, HIV, hepatitis B i C), **parazita** (Sarcoptes scabiei - uzročnik svraba, Phthirus pubis - uzročnik stidnih uši), koje se prenose polnim kontaktima.




Osobe koje se izlažu većem riziku od polno prenosivih bolesti su one

- \* koje rano stupaju u polne odnose
- \* često mijenjaju polne partnere
- \* ne koriste kondom.



Mlađa populacija sklonija je dodatnim oblicima rizičnog ponašanja (konzumiranje alkohola ili opojnih droga) koje za posljedicu mogu imati nezaštićene polne kontakte s nepoznatim osobama.



### Briga o vlastitom zdravlju uključuje i brigu o polnom zdravlju.

Redovan ginekološki pregled je od izuzetne važnosti, posebno u slučajevima slobodnijeg polnog ponašanja koje je kod većeg dijela populacije posebno prisutno u ljetnim tzv. "opuštajućim" mjesecima.



Učešće na konferenciji je dijelom podržao Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koji provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, sredstvima Vlade Švicarske.  
[www.fondacijafami.org](http://www.fondacijafami.org)